

ms
Lane Medical Library

Ueber das
Verhalten der drei isomeren Nitrobenzaldehyde
im Thierkörper.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
einer hohen medizinischen Fakultät zu Bern

vorgelegt von

Alexandra Smirnowa

aus Moskau.

Bern
Buchdruckerei Paul Haller.
1887.


Ueber das
Verhalten der drei isomeren Nitrobenzaldehyde
im Thierkörper.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
einer hohen medizinischen Fakultät zu Bern

vorgelegt von

Alexandra Smirnowa

aus Moskau.



Bern
Buchdruckerei Paul Haller.
1887.

Auf Antrag des Hrn. Prof. *v. Nencki* von der Fakultät zum Drucke
genehmigt.

Bern, den 9. Februar 1887.

Der Dekan:
H. KRONECKER.

Ueber das Verhalten der drei isomeren Nitrobenzaldehyde im Thierkörper.

Seit den bekannten Untersuchungen von *Wöhler* und *Frerichs* ¹⁾ wissen wir, dass Benzaldehyd im Thierkörper zu Benzoessäure oxydirt und als Hippursäure ausgeschieden wird. *Bertagnini* ²⁾ zeigte ferner, dass Nitrobenzoessäure dem Organismus einverleibt als Nitrohippursäure ausgeschieden wird. Die gleiche Nitrohippursäure erhielt er auch durch Einwirkung eines Gemenges von rauchender Salpetersäure und conc. Schwefelsäure auf Hippursäure. Aus diesem Umstande, sowie aus der Beschreibung der Eigenschaften seiner Nitrohippursäure geht hervor, dass die von ihm erhaltene Säure Metanitrohippursäure war.

Andererseits fand *M. Jaffé* ³⁾ bei seinen Untersuchungen über das Verhalten des Para- und des Orthonitrotoluols im thierischen Organismus, dass das Erstere zu Paranitrobenzoessäure oxydirt und als paranitrohippursaurer Harnstoff = $C_9H_8N_2O_5 \cdot CON_2H_4$ ausgeschieden wird. Ganz anders ist das Verhalten des Orthonitrotoluols. Von dieser Verbindung werden nur etwa 10 % zu Orthonitrobenzoessäure oxydirt, welche als solche den Organismus verlässt. Eine Orthonitrohippursäure hat *Jaffé* niemals auffinden können, weder in dem Aetherextrakt, noch in dem Rückstande des Harnes. Die Hauptmenge des eingegebenen Orthonitrotoluols aber wird im Organismus zu Orthonitrobenzylalkohol C_6H_4 $\begin{matrix} \nearrow NO_2 \\ \searrow CH_2 \cdot OH \end{matrix}$ oxydirt, welcher sich mit Glykuronsäure paart. Dieser

¹⁾ Ann. Chem. Pharm. Bd. 65, S. 337.

²⁾ Compt. rend. T. 31, p. 490.

³⁾ Berl. chem. Ber., Bd. 7, S. 1673, und Ztschrft. für physiol. Chem., Bd. 2, S. 47.

Glykuronsäurepaarling von der Zusammensetzung: $C_{13}H_{15}NO_9$,
 $= C_7H_7NO_3 + C_6H_{10}O_7 - H_2O$, von *Jaffé* Uronitrotoluol-
 säure genannt, vereinigt sich noch mit einem Molekül Harn-
 stoff zu einer salzartigen Verbindung von der Zusammen-
 setzung: $C_{14}H_{19}N_3O_{10} + 2\frac{1}{2}H_2O$, so dass die Hauptmenge
 des eingegebenen Orthonitrotoluols in dieser Form mit dem
 Harne ausgeschieden wird.

Bei so differentem Verhalten isomerer Verbindungen im
 Organismus ist es gewiss von Interesse, wenn weitere hierauf
 bezügliche Thatsachen gesammelt werden. Da die drei
 Nitrobenzaldehyde jetzt in reinem Zustande fabrikmässig
 dargestellt werden, so habe ich auf Vorschlag von Professor
Nencki mit diesen drei Substanzen Fütterungsversuche an
 Hunde angestellt und werde in Folgendem die erhaltenen
 Resultate beschreiben. Die Nitrobenzaldehyde wurden von
 der badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen be-
 zogen und zeigten nach dem Umkrystallisiren den richtigen
 Schmelzpunkt, so dass die verfütterten Substanzen chemisch
 rein waren. Der Versuchshund von 22 k. Körpergewicht,
 vertrug tägliche Dosen von 2 gr., die ihm in Fleisch einge-
 wickelt in den Rachen gestossen wurden, ganz gut. Dosen
 von 3—5 gr. pro Tag, die mehrere Tage hintereinander ein-
 gegeben wurden, verursachten Erbrechen und Durchfälle, in
 Folge örtlicher Reizung der Magen- und Darmschleimhaut.
 Der Geschmack aller drei Aldehyde ist brennend, Anfangs
 süsslich, später bitter. Am Wenigsten reizend ist der Para-
 nitrobenzaldehyd, schon intensiver ist der Geschmack der
 Metaverbindung. Ein Krystall des Orthonitrobenzaldehyds
 aber auf die Zunge gebracht, bewirkt ein derartiges Brennen,
 das dem des Cayennepfeffers gleich kommt. Der Hund er-
 hielt daher etwa 8 Tage lang täglich 2—3 gr. von dem be-
 treffenden Nitrobenzaldehyd. Hierauf folgte eine Ruhepause
 von 8 Tagen und dann von Neuem Fütterung mit Nitro-
 benzaldehyd. Der Hund, der täglich $\frac{1}{2}$ k. Pferdefleisch und
 1 k. Brod erhielt, verlor zwar etwas dabei den Appetit und
 magerte kolossal ab. Nach Beendigung der Fütterungs-
 versuche, die mit Unterbrechungen etwa 2 Monate dauerten,
 erholte sich aber das Thier in kurzer Zeit vollständig.

Paranitrobenzaldehyd.

Von diesem Aldehyd erhielt der Hund drei Gramm täglich 5 Tage lang. Der während der Zeit gesammelte Harn wurde auf dem Wasserbade konzentriert, von den sich dabei abscheidenden Phosphaten und geringen Mengen brauner Substanzen filtrirt, dann bis zum Syrup verdunstet und nach dem Erkalten mit Alkohol versetzt. Die von den abgeschiedenen Salzen abfiltrirte alkoholische Lösung wurde wiederum auf dem Wasserbade verdunstet und nach dem Erkalten mit überschüssiger Salzsäure versetzt. Nach kurzem Stehen schieden sich in der Flüssigkeit reichliche Mengen von Krystallen aus, die, wie die spätere Analyse zeigte, paranitrohippursaurer Harnstoff waren. Das Filtrat von den Krystallen gab an Aether noch etwas von der gleichen Substanz ab. Paranitrobenzoesäure oder Paranitrohippursäure wurden dabei nicht erhalten.

Der ausgefällte paranitrohippursäure Harnstoff wurde auf der Wasserstrahlpumpe abfiltrirt und zunächst aus heissem Wasser umkrystallisirt und auf die Weise von der mitgefällten, sehr schwer löslichen Kynurensäure getrennt. Nach mehrfachem Umkrystallisiren aus heissem Alkohol unter Zusatz von Thierkohle wurden schliesslich farblose Krystalle erhalten vom Schmelzpunkt 179° – 180° , die über $\text{SO}_4 \text{H}_2$ getrocknet, folgende Zahlen gaben: 0,2386 gr. Substanz gaben 0,3688 gr. CO_2 und 0,0987 gr. H_2O = 42,15% C und 4,59% H. 0,2726 gr. Substanz gaben 49,6 Cctm. N_{gas} bei $13,8^{\circ}$ und 697 Bst. oder 19,6% N. — Die Formel des paranitrohippursäuren Harnstoffs $\text{C}_9 \text{H}_8 \text{N}_2 \text{O}_5 \text{CON}_2 \text{H}_4$ verlangt 42,25% C, 4,22% H und 19,71% N.

Die Zusammensetzung, der Schmelzpunkt und die sonstigen Eigenschaften unseres Preparates stimmen vollständig mit den von *Jaffé* beschriebenen Eigenschaften des paranitrohippursäuren Harnstoffs überein. Nach Verfütterung von 15 gr. des Paranitroaldehyds erhielten wir 12 gr. des einmal umkrystallisirten Produktes, so dass mit Berücksichtigung der Verluste, die Umwandlung als eine quantitative angesehen werden kann. Auch findet nach Verfütterung des Aldehyds keine Vermehrung der gepaarten Schwefelsäuren


im Harn statt. So ergab der Harn des Hundes nach der Eingabe von 3 gr. des Aldehyds in 50 Cctm. 0,264 gr. $\text{SO}_4 \text{Ba}$ = 0,0906 gr. SO_3 der Salze und 0,024 gr. $\text{SO}_4 \text{Ba}$ = 0,0082 gr. Aetherschwefelsäure. Das Verhältniss der beiden Schwefelsäuren ist also, wie 11:1. Das Verhältniss der beiden Schwefelsäuren bei gewöhnlicher Ernährung des Hundes wurde zu gleicher Zeit öfters bestimmt und schwankte zwischen 6:1 bis 32:1.

Metanitrobenzaldehyd.

Von diesem Körper erhielt der Hund 2 gr. pro die 6 Tage lang, welche Menge er ohne Erbrechen und Durchfälle ertrug. Der Harn wurde genau wie im vorhergehenden Falle verarbeitet. Nach Zusatz von Salzsäure zu dem erkalteten Harnsyrop erstarrte auch dieser auf 0° abgekühlt zu einem Krystallbrei aus rhombischen Säulen bestehend. Die Krystalle wurden auf der Pumpe von der Mutterlauge abfiltrirt und aus Alkohol umkrystallisirt. Dieses Rohprodukt wurde auf Fliesspapier getrocknet, sodann wiederholt aus heissem Wasser, unter Zusatz von Thierkohle und schliesslich aus Alkohol umkrystallisirt. Die Anfangs braunen Krystalle wurden jetzt ganz farblos und schmolzen im Capillarröhrchen bei $165\text{--}167^\circ$. Trocken erhitzt verpufften sie. Da die Krystalle auf ganz gleiche Weise, wie der paranitrohippursäure Harnstoff erhalten wurden, so glaubten wir, dass auch hier eine entsprechende Harnstoffverbindung der Metareihe vorliegt. Die Elementaranalyse belehrte uns aber, dass dem nicht so ist, sondern, dass das nach Fütterung mit Metanitrobenzaldehyd erhaltene Produkt, reine Metanitrohippursäure war.

0,2459 gr. der über $\text{SO}_4 \text{H}_2$ getrockneten Substanz gaben 0,4321 gr. CO_2 und 0,0858 gr. $\text{H}_2 \text{O}$ oder 47,92 % C und 3,87 % H.

0,2376 gr. der Substanz gaben im Zulkowskischen Apparate über 25 % Kalilauge 27,3 Cctm. N_{gas} , bei $18,5^\circ \text{ T.}$ und 710 mm. Bst. oder 12,38 % N. Die Nitrohippursäure



hat folgende prozentische

Zusammensetzung:

Theorie:	Versuch:
C ₉ 48,21 %	47,92 %
H ₈ 3,57 %	3,87 %
N ₂ 12,50 %	12,38 %
O ₅ 35,72 %	

Andere Produkte wurden aus dem Harne nicht erhalten. Der Aetherextrakt, der von den Krystallen filtrirten Mutterlauge, hinterliess nach dem Verdunsten geringe Mengen der Metanitrohippursäure. Auch die gepaarten Schwefelsäuren werden nach Eingabe dieser Verbindung nicht vermehrt. So enthielten 100 Cctm. Harn nach 2 gr. des Aldehyds 1,212 gr. SO₄ Ba = 0,4161 gr. SO₃ der Salze und 0,056 gr. SO₄ Ba = 0,0102 gr. SO₃ gepaart, oder im Verhältniss von 21,67:1. Der Metanitrobenzaldehyd wird also ebenfalls zu Metanitrobenzoesäure oxydirt und, wie schon *Bertagnini* gefunden, als Metanitrohippursäure ausgeschieden.

Orthonitrobenzaldehyd.

Wie schon oben erwähnt, fand *Jaffé*, dass von dem verfütterten Orthonitrotoluol etwa der zehnte Theil zu Orthonitrobenzoesäure, $\frac{9}{10}$ dagegen nur zu Benzylalkohol oxydirt werden, welcher letztere dann in Verbindung mit Glykuronsäure und Harnstoff den Organismus verlässt. Nach unseren Versuchen wird Orthonitrobenzaldehyd zu der entsprechenden Nitrobenzoesäure oxydirt und als solche ausgeschieden. Andere Produkte konnten im Harne nicht aufgefunden werden. Der gleiche Hund erhielt 4 Tage hintereinander je 2 gr. des Aldehyds und der hierauf gelassene Harn wurde gleich wie in vorhergehenden Fällen verarbeitet. Nach Verdunsten des Alkohols und Ansäuren des erkalteten Syrups entstand keine Fällung; dagegen durch Ausziehen mit Aether erhielten wir reichliche Menge schon ziemlich farbloser Krystalle, die nur zweimal aus heissem Alkohol, unter Zusatz von Thierkohle, umkrystallisirt in chemisch reinem Zustande erhalten wurden. Der Schmelzpunkt der Substanz lag bei 146—147°. Nach *Widmann* schmilzt Orthonitrobenzoesäure bei 147°. Die Krystallnadeln hatten einen intensiv süssen Geschmack; auch die Löslichkeitsverhältnisse waren übereinstimmend und eine

Stickstoffbestimmung ergab mit der Formel einer Nitrobenzoesäure übereinstimmende Zahlen.

0,2282 gr. der über $\text{SO}_4 \text{H}_2$ getrockneter Substanz gaben im Zulkowskischen Apparate über 25% Kalilauge 17,7% Cctm. N gas bei 15° T. und 707 mm. Bst. oder 8,38% N. Die Formel: $\text{C}_6 \text{H}_4 \text{NO}_2 \text{CO}_2 \text{H}$ verlangt 8,38% N. In Uebereinstimmung mit *Jaffé* haben auch wir keine Orthonitrohippursäure im Harne auffinden können. Auch die gepaarten Schwefelsäuren scheinen nach Orthonitrobenzaldehyd wenn überhaupt nur sehr wenig vermehrt zu sein. Es wurden folgende Zahlen erhalten: in 50 Cctm. des Harns 0,650 gr. $\text{SO}_4 \text{Ba} = 0,2236$ gr. SO_3 der Salze und 0,109 gr. $\text{SO}_4 \text{Ba} = 0,037$ gr. SO_3 gepaart, oder im Verhältniss von 6:1.

Bei Wiederholung dieses Versuches wurde nach der Verfütterung von 10 gr. des Aldehyds gelassene Harn jedesmal frisch mit basischem Bleiacetat gefällt. Der ausgewaschene und getrocknete Bleiniederschlag wurde dann mit wenig Salzsäure zu einem Brei angerührt und mit Aether, hierauf mit Alkohol extrahirt. Eine Glykuronsäureverbindung konnten wir in beiden Extrakten nicht auffinden. Sie war auch kaum zu erwarten, da bei den von uns verabreichten Dosen circa 80% des Aldehyds als Orthonitrobenzoesäure aus dem Harne wieder erhalten wurden.

Das Ergebniss unserer Versuche lässt sich danach in Folgendem resümiren:

1) Alle 3 Nitrobenzaldehyde werden im Organismus zu den entsprechenden Nitrobenzoesäuren oxydirt.

2) Die Art, wie die entstandenen Säuren ausgeschieden werden, ist je nach der relativen Stellung der Seitenketten eine verschiedene, indem die Paranitrobenzoesäure als paranitrohippursaurer Harnstoff, die Metanitrobenzoesäure als Metanitrohippursäure und die Orthonitrobenzoesäure ohne jede Paarung den Thierkörper verlassen.

Zum Schlusse sage ich meinem hochgeehrten Lehrer Herrn Professor *Nencki* und der Frau Dr. *N. Sieber* meinen besten Dank für die mir bei dieser Arbeit gewährte thatkräftige Unterstützung.



~~Handwritten signature or scribble~~

Handwritten signature or scribble